




## Sortie printanière du 11 avril 2026 en forêt de Fontainebleau

Nous étions encore en petit comité (18 personnes) pour cette deuxième sortie printanière. Les premières sorties n'attirent plus les foules car les morilles se font de plus en plus rare ; ceci dit, cette année j'en ai personnellement trouvé une vingtaine (contre une seule en 2025) ce qui pourrait laisser penser que la maladie des frênes n'est pas forcément un obstacle à leur apparition, hypothèse que j'avais avancée les années précédentes. Par ailleurs, les premières morilles sont sorties cette année dès la mi-mars et on est donc déjà en fin de saison. Avec le printemps qui se fait de plus en plus précoce, je pense que je vais avancer un peu le calendrier des sorties dès 2027.

Bref, Michèle nous a quand même dégoté une vieille morille comestible ([Morchella esculenta](#)), une vieille blonde quelque peu défraîchie, pour sauver l'honneur. Sinon, il y avait les espèces habituelles de la saison en ce lieu. Nous avons eu un débat sur les stérées, entre le remarquable ([Stereum insignitum](#)) et le subtomenteux ([Stereum subtomentosum](#)).



Le premier a été cité 2 fois plus souvent que le second dans nos récoltes mais peut être par erreur car il s'avère que les deux se ressemblent, le deuxième ayant une fixation sur le support



moins large que le premier. Une autre différence est essentielle au niveau de la micrographie, le stérée remarquable a des acanthophyses (ce sont des éléments cylindriques ou clavés de l'hyménium qui sont ornés d'expansions épineuses). La photo de Bruno nous oriente vers *S. subtomentosum*. La liste des 20 espèces récoltées est consultable à partir de [cette page](#).

Denis Lecarpentier